



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27 CH-8555 Müllheim
Telefon 052 630 50 50 www.tezetag.ch

Impfplan für Schweine

Grundsätze

1. Nur gesunde Tiere impfen
2. Am besten für jeden Impfstoff eine separate Spritze gebrauchen
3. Spritzen nur mit heissem Wasser waschen, NICHT mit Alkohol, Desinfektionsmitteln oder Seife

Rotlauf und Parvovirose (Porcilis Ery und Parvo, Erysen Parvo)

2ml hinter einem Ohr in den Muskel

Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten

- 2x im Abstand von 4 Wochen vor dem Decken (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Decken).

Grundimmunisierung von Sauen

- 2x im Abstand von 4 Wochen in der Sägezeit

Wiederholungsimpfungen

- Eine Woche vor, oder beim Absetzen der Ferkel

Coli-Durchfall (Porcilis porcoli, Suiseng Coli/C)

2ml hinter einem Ohr in den Muskel

Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

- 2x im Abstand von 3-4 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 4 Wochen vor dem Abferkeln).
- Bei hohem Infektionsdruck könnten 3 Impfungen als Grundimmunisierung nötig sein

Wiederholungsimpfungen

- 4 Wochen vor dem Abferkeln

HPS = Glässer (Haemophilus parasuis)

Grundimmunisierung von Jungsauen / Remonten / Sauen

4 ml stallspezifische Vakzine oder 2ml Porcilis Glässer hinter einem Ohr in die Muskulatur

- 2x im Abstand von 3-6 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Abferkeln). z.B. zwischen 40. - 50. und 80. - 90. Trächtigkeitstag

Wiederholungsimpfungen

- 3 bis 4 Wochen vor dem Abferkeln



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27 CH-8555 Müllheim
Telefon 052 630 50 50 www.tezetag.ch

(Diese Impfung wird bei Krankheitszeichen von Ferkel, Remonten und Muttersauen angewendet. Eine Teilwirkung bleibt bei den Ferkeln geimpfter Muttersauen bis zum Gewicht um 25 kg bestehen. Bei starkem Erregerdruck müssen die Ferkel/Jäger geimpft werden.)

Grundimmunisierung von *Ferkeln*

2 ml hinter einem Ohr

- 2x im Abstand von 3 Wochen (2. Impfung mindestens 3 Wochen vor dem Einstellen zur Mast). Tiere jünger als 5 Wochen nicht impfen.

Clostridien-Durchfall (Suiseng Coli/C; wenn zusätzlich Cl. Typ A – mit Suiseng Diff/A mischen)

Grundimmunisierung von *Jungsauen* / *Remonten* / *Sauen*

2ml hinter einem Ohr in die Muskulatur

- 2x im Abstand von 4 Wochen vor dem Abferkeln (2. Impfung mindestens 4 Wochen vor dem Abferkeln). Z.B. zwischen 40. - 50. und 80. - 90. Trächtigkeitstag
- Bei hohem Infektionsdruck könnten 3 Impfungen als Grundimmunisierung nötig sein

Wiederholungsimpfungen:

- spätestens 4 Wochen vor dem Abferkeln

Lawsonien-Durchfall (Enterisol Ileitis, Porcilis Lawsonia)

Enterisol: Ferkel ab einem Alter von 3 Wochen, aber vor dem Absetzen, 2ml einmalig eingeben, Tiere dürfen 3 Tage vor und 3 Tage nach der Behandlung kein Antibiotikum erhalten.

Porcilis Lawsonia: Ferkel ab einem Alter von 3 Wochen 2ml in Muskel

Circovirose Ferkelimpfung (Circoflex/Porcilis PCV)

1ml/2ml zwischen dem 14. und 21. Lebenstag, hinter einem Ohr in die Muskulatur. Impfschutz hält bis in die 20. Lebenswoche an.

Wird Circo-Impfstoff bei Ferkelimpfung nicht vollständig aufgebraucht, so wird empfohlen mit dem Restimpfstoff die Jungsauen nachzuimpfen