



Tiermedizinisches Zentrum

Frauenfelderstr. 27, CH-8555 Müllheim
Telefon 052 630 50 50 www.tezetag.ch
CHE-289.532.653 HR/MWST

Flohbekämpfung

Der Floh

Flöhe sind ca. 1-8mm grosse Insekten, die sich ausschliesslich durch Blutsaugen auf einem Wirtstier wie Hund, Katze oder sogar Mensch ernähren. Das aufgenommene Blut wird nur unvollständig verdaut und rasch wieder ausgeschieden. Deshalb findet man bei einer Untersuchung oft keine Flöhe, dafür aber kleine schwarze Punkte, den Flohkot. Feuchtet man diese Partikel mit einem Papiertaschentuch etwas an, so verfärbt sich das Tuch rotbraun.

Nur die erwachsenen Flöhe leben auf einem Wirtstier. Ein Weibchen legt täglich 10 bis 15 Eier, insgesamt mehrere hundert. Die Eier fallen irgendwo auf den Boden (auch im Haus!) und daraus schlüpfen dann Larven. Die Larven ernähren sich vom Flohkot und leben versteckt in Teppichen, Bodenritzen, Kissen, Decken und Polstermöbeln. Die Larven verpuppen sich, aus der Puppe schlüpft ein junger Floh, der dann wieder auf ein Wirtstier hüpfte.

Problematik

In den letzten Jahren wurden Flöhe zu einem wachsenden Problem. Dies hat verschiedene Ursachen:

- Flöhe in der freien Natur werden wegen der milden Winter nicht mehr abgetötet
- Zentralbeheizte, mit Teppichen ausgelegte Räume bieten den Flöhen das ganze Jahr über ideale Lebensbedingungen
- Hund und Katze werden als Haustiere immer beliebter. Flöhe finden so leichter ein Wirtstier
- Oft wird das Problem nicht ernst genug genommen oder gar ignoriert. Oder es wird nur das Tier behandelt obwohl 95% der Flöhe in der Umgebung leben
- Flöhe vermehren sich sehr schnell: Aus 10 Weibchen werden innerhalb eines Monats 1800 erwachsene Flöhe und 250'000 Eier, Larven und Puppen.
- die Flöhe sind nicht mehr wirtstreu, das heisst man findet auf Hunden und Katzen auch Igelflöhe und umgekehrt.

Durch Flöhe verursachte Krankheiten

Bandwürmer

Der Floh ist Zwischenwirt für den Gurkenkernbandwurm. Durch Zerbeissen von Flöhen gelangen die Bandwurmlarven in den Endwirt (Hund, Katze).

Hämobartonellose

Ein möglicherweise auch durch Flöhe übertragenes Bakterium. Der Verlauf ist unterschiedlich, in der Regel leiden die betroffenen Tiere an Fieber und Blutarmut, Todesfälle sind möglich. Die Krankheit wird selten gesehen, kann aber v.a. bei immunschwachen Tieren auftreten.

Flohdermatitis

Durch die Flohbisse ausgelöste Hautentzündung, oder durch übermässiges Kratzen verletzte und infizierte Haut.

Flohallergie

Starke Hautentzündung mit Rötungen, Schwellungen und Juckreiz infolge einer Allergie auf Flohspeichel. Ein einziger Flohbiss genügt, um am ganzen Körper eine Reaktion auszulösen.

Blutarmut

Bei massivem Flohbefall wird das Wirtstier regelrecht ausgesaugt.

G:\PRAXIS\INFOS\Kleintiere\Flohbekämpfung.doc

Stand April 2026

Bekämpfung

Es sollten immer alle im gleichen Haushalt lebenden Tiere (Hunde u. Katzen) behandelt werden.

Zur Behandlung des Tieres stehen folgende Möglichkeiten (in unserer Praxis) zur Verfügung:

Anwendungsart	Produkt	Tierarten	Beschreibung
Halsband	☐ Scalibor	Hd	3-5 Monate wirksam, auch gegen Zecken, geruchlos, sehr gute Repellentwirkung
	☐ Seresto	Hd, Kz	7-8 Monate wirksam gegen Flöhe und Zecken
	☐ Preventef	Kz	6-8 Monate wirksam, gegen Flöhe und Zecken
Auftragelösung	☐ Frontline Combo	Hd, Kz	1 Monat wirksam, gegen Zecken, 2 Monate gegen Flöhe
	☐ Stronghold	Hd, Kz	1 Monat wirksam, auch gegen Milben, Spulwürmer und als Herzwurmprophylaxe
	☐ Advantix	Hd	1 Monat wirksam, sehr gute Zeckenwirkung, auch als Repellent. Giftig für Katzen!
	☐ Advocate	Hd, Kz	1 Monat wirksam, gegen alle äusseren und inneren Parasiten (ausser Bandwürmer)
	☐ Bravecto	Kz	Gegen Zecken und Flöhe, 3 Monate wirksam
	☐ NexGard Combo	Kz	1 Monat wirksam, gegen alle äusseren und inneren Parasiten
Spray	☐ Effipro	Hd, Kz	gut geeignet für kleine Tiere und Welpen
Tabletten	☐ Capstar	Hd, Kz	Wirkt 48h, v.a. akuter Flohbefall, tötet Flöhe innert Stunden ab (Initialtherapie)
	☐ Bravecto	Hd	3 Monate wirksam, gegen Flöhe, Zecken und Milben
	☐ Credelio	Kz	1 Monat wirksam, gegen Flöhe, Zecken und Milben

Die Umgebung kann wie folgt behandelt werden:

1. Wohnung gründlich staubsaugen (speziell gründlich an dunklen Orten), Staubsaugersack entsorgen, ev. ein Stück Flohband mit in den Staubsaugersack legen.
2. Alle Überzüge von Polstermöbeln/Kissen waschen, wenn möglich Kochwäsche.
3. Mit INDOREX oder FLEE Umgebungsspray alle Lagerstellen des Tieres besprühen. Auch unter Kissen, Teppichrändern, Polstermöbeln, etc. Wirkung für 6 Monate.
4. Bei sehr schwerem Befall oder alten Häusern evtl. Verwendung eines Foggers (Vernebler) zur Verteilung der Sprays, mit dem die ganze Wohnung gleichzeitig behandelt werden kann.